

## **FLUIDASA®**

Mepifilina Noas Farma Uruguay

Broncodilatador con acción antihistamínica y relajante a nivel de la musculatura lisa bronquial.

### **ACCIÓN FARMACOLÓGICA**

Mepifilina, único principio activo de **FLUIDASA®**, es una molécula en la que se conjugan y potencian los efectos del ácido teofilina acético y de la mepiramina (un potente antihistamínico).

### **MECANISMO DE ACCIÓN**

A través de la acción del ácido teofilina acético, **FLUIDASA®** provoca inhibición de la fosfodiesterasa, con el consiguiente aumento del AMP cíclico a nivel del bronquio, lo que tiene como resultado la relajación del músculo liso bronquial, lográndose así bronco dilatación. La mepiramina neutraliza mediadores que participan en la respuesta inflamatoria favoreciendo la reducción del edema a nivel del árbol respiratorio, contribuyendo, de esta manera, al incremento del diámetro bronquial y al aumento del flujo aéreo.

### **INDICACIONES**

- Asma bronquial y sus equivalentes (tos de mecanismo alérgico).
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Bronquitis aguda.

### **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES**

No debe ser utilizado durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre.

### **REACCIONES ADVERSAS**

A dosis terapéuticas habitualmente no presenta. Se ha descrito somnolencia y aceleración del tránsito intestinal.

### **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

Puede potenciar la acción depresora sobre el sistema nervioso central de antihistamínicos, sedantes e hipnóticos.

### **POSOLOGÍA**

#### **Fluidasa® Gotas**

##### Lactantes

Dosis media: 3 mg por kg de peso por día, fraccionada en 3 o 4 tomas.

Equivalencia: 3 gotas por kg de peso por día, fraccionada en 3 o 4 tomas.

Dosis máxima: 6 mg por kg de peso por día, fraccionada en 3 o 4 tomas.

Equivalencia: 6 gotas por kg de peso por día, fraccionada en 3 o 4 tomas.

#### Niños menores de 5 años

Dosis media: 8 mg por kg de peso por día, fraccionada en 3 o 4 tomas.

Equivalencia: 8 gotas por kg de peso por día, fraccionada en 3 o 4 tomas.

Dosis máxima: 10 mg por kg por día.

Equivalencia: 10 gotas por kg de peso por día.

#### **Fluidasa® Solución**

##### Niños menores de 5 años

1 a 2 medidas de 5 ml cada 8 horas.

##### Niños mayores de 5 años

2 a 3 medidas de 5 ml cada 8 horas.

##### Adultos

15 a 30 ml cada 8 horas.

#### **Fluidasa® Cápsulas**

##### Adultos

1 a 2 cápsulas cada 8 horas.

Dosis media: 3 cápsulas por día, repartidas en 3 tomas cada 8 horas.

#### **FÓRMULA Y PRESENTACIÓN**

##### **Fluidasa® Cápsulas**

Envase con 20 cápsulas, conteniendo 150 mg de Mepifilina por cápsula.

##### **Fluidasa® Gotas**

Envase con un frasco gotero de 30 ml, conteniendo 20 mg de Mepifilina por ml.

##### **Fluidasa® Solución**

Envases con un frasco de 150 ml, conteniendo 25 mg de Mepifilina cada 5 ml.

En caso de intoxicación consultar al C.I.A.T. (Tel. 1722).

#### **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Mantener entre 10° y 30° C

Control médico recomendado

M.S.P. Reg. N° 31277-31279-31278. Ley 15443

D.T.: Q.F. Beatriz Raffo

#### **NOAS FARMA URUGUAY S.A.**

Lab. N° 311

Industria Uruguaya

Fluidasa®: marca registrada Abbott GmbH & Co. KG.



**noas**farmauruguay  
especialidades farmacéuticas

Río Negro 1573 | Montevideo | Uruguay

Tel. 2903 0769\* | Fax: 2903 0766

noasfarma@noasfarma.com.uy

www.noasfarma.com.uy